genomedics
transforming data into health

GPG7
GENERAL PRACTICE GOVERNANCE

GPG per gli obiettivi della tua AFT · Audit di Gruppo

Come monitorare gli indicatori, individuare le criticità e migliorare i risultati di tutta la AFT.



Accesso al modulo AFT dalla homepage

Il percorso di accesso è interno a GPG, indipendentemente dalla cartella clinica utilizzata.



La disponibilità del modulo dipende dall'abilitazione dell'utente.

Le novità del modulo

Il nuovo Audit di Gruppo AFT rende più immediata la lettura dei risultati del gruppo e dei singoli medici.



Tabella con valori individuali, obiettivi AFT, colori e filtri per medico.

Confronto tra medici

Priorità di intervento e distribuzione dei risultati all'interno dell'AFT.

Panoramica

Approfondimento degli indicatori, andamento nel tempo ed Excel anche via e-mail.

Dettagli ed esportazione

1. Accesso e periodo di analisi

Nell’area AFT, apri la scheda Audit di gruppo AFT. I filtri in alto definiscono il contesto della consultazione.





Data analisi

Scegli il mese a cui si riferiscono i risultati.

Medici

Definisci quali medici visualizzare nel confronto.

2. Confronto tra medici

La tabella affianca il risultato dell'AFT ai valori dei medici, con una riga per ciascun indicatore.



INDICATORE	AFT · obiettivo	Tu 15/16	MMG 1 15/16	MMG 3 0/0	MMG 4 N.D.	MMG 5 0/0	MMG 6 3/15
Consumo farmaci (Antibiotici)							
AFTS-GCATB01_1 Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti (Anno corrente)	4,1 senza obiettivo	5,7	2,6	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AFTS-GCATB01_2 Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti (Anno precedente)	4,9 senza obiettivo	8,3	6,3	N.D.	N.D.	N.D.	0,0
AFTS-GCATB01_3 Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti (Variazione %)	-45,2 ≤-10 · raggiunto	-32,1	-58,3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Lista Trapianti							
AFTS-GCLT01 Pazienti con IRC stadio V e filtrato glomerurale <20 ml/min con prescrizione alla valutazione LAT (list…	50,0% 3/6 ≥90% · mancano 3	100,0 2/2	100,0 1/1	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 0/3
Presa in carico dei pazienti cronici - BPCO							
AFTS-GCBPCO00 Pazienti di età ≥18 anni con BPCO (Prevalenza)	3,7% prevalenza 150/4004	3,3 46/1405	3,3 36/1100	N.D.	N.D.	N.D.	4,5 68/1499
AFTS-GCBPCO01 Pazienti di età ≥45 anni con diagnosi di BPCO (e senza diagnosi o esenzione per Asma) e in…	79,8% prevalenza 103/129	94,6 35/37	72,2 26/36	N.D.	N.D.	N.D.	75,0 42/56
AFTS-GCBPCO02_1 Pazienti di età ≥45 anni con diagnosi di BPCO (e senza diagnosi o esenzione per Asma) aderenti al…	69,9% 72/103 ≥40% · raggiunto	88,6 31/35	57,7 15/26	N.D.	N.D.	N.D.	61,9 26/42
AFTS-GCBPCO02_2 Pazienti di età ≥45 anni con diagnosi di BPCO (e senza diagnosi o esenzione per Asma) aderenti al…	53,4% 55/103 ≥40% · raggiunto	88,6 31/35	65,4 17/26	N.D.	N.D.	N.D.	16,7 7/42
AFTS-GCBPCO02_3 Pazienti di età ≥45 anni con diagnosi di BPCO (e senza diagnosi o esenzione per Asma) aderenti al…	35,0% 36/103 ≥40% · mancano 6	71,4 25/35	42,3 11/26	N.D.	N.D.	N.D.	0,0 0/42



Le righe identificano gli indicatori.
Le colonne riportano AFT, Tu e gli altri medici.

Righe e colonne

Colori, valori e conteggi aiutano a riconoscere gli obiettivi raggiunti e le aree da approfondire.

Lettura immediata

3. Il riepilogo del medico

Il riepilogo in alto si riferisce al medico selezionato. All'accesso, il riquadro Tu identifica il tuo profilo.



Obiettivi raggiunti

Quanti obiettivi risultano raggiunti rispetto a quelli valutati.

Meglio del valore AFT

In quanti indicatori il risultato è migliore del valore del gruppo.

Dove recuperare

L'indicatore su cui il cruscotto segnala il maggiore margine di intervento.

Selezionando un altro medico, il riepilogo e la colonna evidenziata si aggiornano.

4. Selezione dei medici

Medici permette di concentrarsi su uno o più colleghi, mantenendo il riferimento all'AFT.



Apri Medici, spunta i profili di interesse e conferma con «Fatto». Mostra tutti ripristina l'elenco completo.

Selezione multipla

Il tuo risultato e il valore AFT restano visibili anche quando restringi la selezione.

Riferimenti sempre presenti

5. Categorie di indicatori

I pulsanti delle categorie limitano la tabella all'area scelta. Cliccando su «Tutti» si ripristina la consultazione completa.





La tabella si restringe alla categoria selezionata.
Anche i conteggi del riepilogo riflettono il filtro.

Esempio: Lista Trapianti

6. La legenda della tabella

La legenda distingue il raggiungimento dell’obiettivo, lo scostamento, la prevalenza e i dati non disponibili.



01 **Obiettivo raggiunto**

Per gli indicatori con target, la cella verde segnala il raggiungimento dell’obiettivo.

02 **Scostamento dall’obiettivo**

La legenda distingue fino a 10 punti percentuali sotto la soglia e oltre 10 punti sotto.

03 **Prevalenza**

Il colore lilla identifica gli indicatori di contesto.

04 **N.D. / sotto soglia**

Il tratteggio segnala i dati non disponibili o le situazioni indicate dalla legenda.

7. La Panoramica dell’AFT

La scheda Panoramica offre una sintesi del gruppo e una lettura grafica dei risultati dei medici.



7. La Panoramica dell’AFT

La scheda Panoramica offre una sintesi del gruppo e una lettura grafica dei risultati dei medici.



Obiettivi AFT raggiunti

I segmenti mostrano lo stato degli obiettivi. Al passaggio del mouse compaiono i dettagli.

La tua posizione

Conta gli indicatori in cui il tuo valore è migliore di quello AFT. Il rapporto 2 su 31 si riferisce agli indicatori.

Disponibilità dei dati

Indica quanti medici contribuiscono ai risultati e segnala quelli senza dati.

8. Priorità di intervento e categorie

La Panoramica consente di cambiare l’organizzazione dell’elenco, mantenendo gli stessi indicatori.





Priorità di intervento

Porta in evidenza gli ambiti su cui il cruscotto segnala maggiore necessità di intervento.

Per categoria

Raggruppa gli indicatori per area e mostra, per ogni sezione, gli obiettivi raggiunti.

I filtri tematici restano disponibili in entrambe le organizzazioni dell’elenco.

9. AFT, valore personale e obiettivo

Ogni riga mette in relazione il valore AFT, il tuo risultato e il target dell’indicatore.



Valore AFT

Risultato del gruppo. Negli indicatori percentuali sono visibili anche numeratore e denominatore.

Tu e scarto vs AFT

Il tuo risultato e la differenza rispetto al valore del gruppo. Per le percentuali lo scarto è espresso in punti percentuali (pp).

Obiettivo AFT

Stato del target e, quando previsto, numero di pazienti mancanti per raggiungerlo.

10. La distribuzione dei medici

Ogni punto colloca il risultato di un medico sulla scala dell'indicatore. Il passaggio del mouse mostra i dettagli.



Punto cerchiato

Identifica il tuo risultato.

Tratto azzurro

Indica il valore AFT.

Linea tratteggiata

Indica l'obiettivo, quando presente.

11. Dati non disponibili ed esclusioni

Le segnalazioni sui dati spiegano quali risultati entrano nel confronto e nei totali.



Il dato non è disponibile per il periodo scelto. Il cruscotto segnala anche i medici con accesso, privacy o licenza non completati.

N.D. – dato non disponibile

Nessun paziente nel denominatore per il periodo selezionato.

N.R. – non rilevabile

Con l'esclusione attiva, i valori di prevalenza sotto la soglia minima appaiono come cerchi vuoti e non entrano nei totali della patologia.

Escluso

N.D. e N.R. non corrispondono a un valore pari a zero.

12. Il dettaglio dell’indicatore

Seleziona un indicatore dalla tabella o dalla Panoramica per aprire la pagina di approfondimento.



Riepilogo dell’indicatore

Il dettaglio presenta risultato AFT, obiettivo e valore personale. I conteggi chiariscono la base del risultato.

Documentazione e ritorno

Sono disponibili Scheda indicatore, Avvertenza e Dichiarazione di non responsabilità. Tutti gli indicatori riporta all’elenco.

13. Il confronto nel dettaglio

Le barre individuali permettono di leggere il risultato di ciascun medico rispetto ai riferimenti dell'indicatore.



Barre e conteggi

Valore, numeratore e denominatore accompagnano ogni medico quando disponibili.

Pazienti mancanti

La colonna Mancano indica quanti pazienti servono al singolo medico per il target.

14. L’andamento nel tempo

Il grafico ‘Andamento’ consente di seguire l’evoluzione dei risultati nei periodi disponibili.



La linea azzurra mostra l’AFT e quella blu il tuo risultato, quando disponibile. Il target compare come linea tratteggiata.

Le serie del grafico

Il grafico indica la curva AFT come media dei medici. Può differire dal valore aggregato riportato nel riepilogo.

Il riferimento da leggere

15. Come si calcola l’indicatore

Nella parte inferiore del dettaglio, Come si calcola esplicita i criteri utilizzati dall’indicatore.



Come si calcola

N **NUMERATORE**
Pazienti con IRC stadio V e filtrato glomerurale <20 ml/min (ancora in fase conservativa) con prescrizione di "visita nefrologica L.A.T." (Lista Attesa Trapianti) per essere sottoposti a valutazione per trapianto

D **DENOMINATORE**
Pazienti con IRC stadio V e filtrato glomerurale <20 ml/min (ancora in fase conservativa)

I PAZIENTI SU CUI DEVI AGIRE

Pazienti con IRC stadio V e filtrato glomerurale <20 ml/min (ancora in fase conservativa) senza prescrizione di "visita nefrologica L.A.T." (Lista Attesa Trapianti) per essere sottoposti a valutazione per trapianto

3 pazienti

RAZIONALE
Poiché un eGFR <20 ml/min potrebbe definire anche pazienti in Stadio IV o potrebbero essere presenti codifiche ICD-9-CM identificative di IRC terminale oppure le codifiche ICD-9-CM identificative di IRC potrebbero essere state registrate in momenti precedenti, quando la funzionalità renale risultava ancora superiore a 20 ml/min; ai fini della identificazione del denominatore vengono considerate tutte le codifiche ICD-9-CM riconducibili a IRC, indipendentemente dallo stadio riportato, associandole alla presenza di un valore (ultimo) di eGFR <20 ml/min.

Identificano i pazienti conteggiati e la popolazione a cui si riferisce la misura.

Numeratore e denominatore

Il riquadro descrive i pazienti interessati e ne riporta il numero.

I pazienti su cui devi agire

Chiarisce l’interpretazione e i criteri dell’indicatore.

Razionale

16. GPG Report Obiettivi di AFT

Consente di scaricare il riepilogo in formato Excel. Il comando si trova in alto a destra.



Download del riepilogo

Verifica il gruppo e il periodo di analisi, quindi seleziona Esporta Obiettivi di AFT.

Ricezione per e-mail

Il comando accanto all’esportazione permette di attivare la ricezione del file e programmarne l’invio.

16. GPG Report Obiettivi di AFT

Attiva Ricevi per e-mail e apri il calendario per impostare frequenza, giorno e ora.

Ogni mese



Ogni settimana



Scegli la cadenza mensile o settimanale e imposta giorno e ora. Verifica il destinatario e usa Cambia per modificarlo.

Impostazioni di invio

L'invio usa l'ultimo periodo disponibile al momento della spedizione.

Dati utilizzati

Salva conferma la programmazione. Invia ora richiede un invio immediato.

17. La vista classica

La tabella classica resta raggiungibile dal comando in fondo alla pagina del nuovo cruscotto.





Gruppo, Descrizione	Obiettivo AFT	Gap Obiettivo	Grafico media	Totale AFT	Personale 25/10/2026	MMG 1 26/10/2026	MMG 3	MMG 4	MMG 5	MMG 6 30/10/2026
Consumo farmaci (Antibiotici)										
Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti (Anno corrente) (AFTS-GCATB01_1)			4,14	8,28	5,66	2,62	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti (Anno precedente) (AFTS-GCATB01_2)			4,87	14,62	8,34	6,27	N.D.	N.D.	N.D.	0,01
Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti (Variazione %) (AFTS-GCATB01_3)	✓		-45,20	-43,37	-32,14	-58,26	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Lista Trapianti										
Pazienti con IRC stadio V e filtrato glomerurale <20 ml/min con prescrizione alla valutazione LAT (lista attesa trapianti) per trapianto (AFTS-GCLT01)	⚠	3	66,67%	50,00% (3 / 6)	100,00% (2 / 2)	100,00% (1 / 1)	N.D.	N.D.	N.D.	0,00% (0 / 3)
Presa in carico dei pazienti cronici - BPCO										
Pazienti di età ≥18 anni con BPCO (Prevalenza) (AFTS-GCBPCO00)			3,69%	3,75% (150 / 4.004)	3,27% (46 / 1.405)	3,27% (36 / 1.100)	N.D.	N.D.	N.D.	4,54% (68 / 1.499)
Pazienti di età ≥45 anni con diagnosi di BPCO (e senza diagnosi o esenzione per Asma) e in trattamento con broncodilatatori a lunga durata d'azione nel corso del 2025 (AFTS-GCBPCO01)			80,60%	79,84% (103 / 129)	94,59% (35 / 37)	72,22% (26 / 36)	N.D.	N.D.	N.D.	75,00% (42 / 56)
Pazienti di età ≥45 anni con diagnosi di BPCO (e senza diagnosi o esenzione per Asma) aderenti al trattamento con broncodilatatori a lunga durata d'azione (I quadrimestre) (AFTS-GCBPCO02_1)	✓		69,39%	69,90% (72 / 103)	88,57% (31 / 35)	57,69% (15 / 26)	N.D.	N.D.	N.D.	61,90% (26 / 42)

Seleziona Passa alla vista classica per aprire la griglia precedente. Torna al nuovo cruscotto ripristina la nuova interfaccia.

Passaggio tra le viste

Il percorso di consultazione

Le due viste e il dettaglio accompagnano la consultazione degli indicatori fino al riepilogo esportabile.



01 Selezione del contesto

Gruppo, periodo e medici definiscono la consultazione.

02 Lettura dei risultati

Confronto tra medici affianca i valori. Panoramica evidenzia le priorità e la distribuzione.

03 Approfondimento

Il dettaglio mostra obiettivo, pazienti mancanti, andamento e criteri di calcolo.

04 Riepilogo disponibile

Esportazione Excel o ricezione per e-mail, anche programmata.